

# Inhaltsverzeichnis

(Ausschnitt)

- 7 Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit
  - Bedingte Wahrscheinlichkeiten
  - Stochastische Unabhängigkeit

# Bedingte Wahrscheinlichkeiten I

- Oft interessant: Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses  $B$ , wenn schon bekannt ist, dass ein (anderes) Ereignis  $A$ , in diesem Zusammenhang auch **Bedingung** genannt, eingetreten ist.
- Beispiele:
  - ▶ Werfen eines Würfels:  
Wahrscheinlichkeit dafür, eine 2 gewürfelt zu haben, falls bekannt ist, dass eine ungerade Zahl gewürfelt wurde  $\rightsquigarrow 0$   
Wahrscheinlichkeit dafür, eine 3 oder 4 gewürfelt zu haben, falls bekannt ist, dass eine Zahl größer als 3 gewürfelt wurde  $\rightsquigarrow \frac{1}{3}$
  - ▶ Wahrscheinlichkeit, aus einer Urne mit 2 schwarzen und 2 weißen Kugeln bei Ziehung ohne Zurücklegen in der zweiten Ziehung eine weiße Kugel zu ziehen, wenn bekannt ist, dass in der ersten Ziehung eine schwarze Kugel gezogen wurde  $\rightsquigarrow \frac{2}{3}$
  - ▶ Wahrscheinlichkeit, dass man beim Poker-Spiel (Texas Hold'em) zum Ende des Spiels einen Vierling als höchstes Blatt hat, wenn man bereits ein Paar in der Starthand hält  $\rightsquigarrow 0.8424\%$

# Bedingte Wahrscheinlichkeiten II

- Offensichtlich sind diese Wahrscheinlichkeiten nur dann interessant, wenn das Ereignis  $A$  auch mit positiver Wahrscheinlichkeit eintritt.

- *Rückblick:*

In deskriptiver Statistik: Begriff der *bedingten relativen Häufigkeiten*

- ▶  $r(a_i|Y = b_j) := \frac{h_{ij}}{h_{\cdot j}} = \frac{r_{ij}}{r_{\cdot j}}$

- ▶  $r(b_j|X = a_i) := \frac{h_{ij}}{h_{i\cdot}} = \frac{r_{ij}}{r_{i\cdot}}$

für  $i \in \{1, \dots, k\}$  und  $j \in \{1, \dots, l\}$ .

- Analog zur Einschränkung der statistischen Masse bei bedingten relativen Häufigkeiten: Einschränkung von  $\Omega$  auf bedingendes Ereignis  $A$ .

# Bedingte Wahrscheinlichkeiten III

- Zur Ermittlung der bedingten Wahrscheinlichkeit, eine 3 oder 4 gewürfelt zu haben (Ereignis  $B = \{3, 4\}$ ), falls bekannt ist, dass eine Zahl größer als 3 gewürfelt wurde (Ereignis  $A = \{4, 5, 6\}$ ):
  - ▶ Berechnung der Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Eintretens der Bedingung  $A$  und des interessierenden Ereignisses  $B$ :
$$P(A \cap B) = P(\{3, 4\} \cap \{4, 5, 6\}) = P(\{4\}) = \frac{1}{6}$$
  - ▶ Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Bedingung  $A$ :
$$P(A) = P(\{4, 5, 6\}) = \frac{3}{6}$$
  - ▶ Analog zum Fall relativer bedingter Häufigkeiten: Berechnung des Verhältnisses  $\frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{1}{3}$ .

# Bedingte Wahrscheinlichkeiten IV

## Definition 7.1

Es seien  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  ein Wahrscheinlichkeitsraum und  $A, B \in \mathcal{F}$  mit  $P(A) > 0$ . Dann heißt

$$P(B|A) := \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

die **bedingte Wahrscheinlichkeit** von  $B$  unter der Bedingung  $A$ .

## Satz 7.1

Es seien  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  ein Wahrscheinlichkeitsraum und  $A \in \mathcal{F}$  mit  $P(A) > 0$ . Dann ist die Abbildung

$$P(\cdot | A) : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}; B \mapsto P(B|A)$$

ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf  $\mathcal{F}$  gemäß Definition 5.4, also auch  $(\Omega, \mathcal{F}, P(\cdot | A))$  ein Wahrscheinlichkeitsraum.

# Bedingte Wahrscheinlichkeiten V

- **Wichtig:** Satz 7.1 gilt nur dann, wenn das bedingende Ereignis  $A$  festgehalten wird. Bei der Abbildung  $P(A|\cdot) : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$  handelt es sich im Allgemeinen **nicht** (und bei strenger Auslegung von Definition 7.1 sogar **nie**) um ein Wahrscheinlichkeitsmaß.
- Aus Definition 7.1 folgt unmittelbar

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) \quad (1)$$

für  $A, B \in \mathcal{F}$  mit  $P(A) > 0$ .

- Obwohl  $P(B|A)$  nur für  $P(A) > 0$  definiert ist, bietet es sich aus technischen Gründen an, Schreibweisen wie in Gleichung (1) auch für  $P(A) = 0$  zuzulassen. In diesem Fall sollen Produkte, in denen neben (eigentlich) nicht definierten bedingten Wahrscheinlichkeiten mindestens ein Faktor 0 auftritt, definitionsgemäß ebenfalls den Wert 0 annehmen.

# Bedingte Wahrscheinlichkeiten VI

- Mit dieser Konvention für Bedingungen mit Eintrittswahrscheinlichkeit 0 lässt sich durch wiederholtes Einsetzen von Gleichung (1) leicht der **Multiplikationssatz**

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

für  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$  herleiten.

- Mit dem Multiplikationssatz können insbesondere Wahrscheinlichkeiten in sogenannten Baumdiagrammen (für „mehrstufige“ Zufallsexperimente) ausgewertet werden.
- In vielen Anwendungen sind häufig vor allem bedingte Wahrscheinlichkeiten bekannt (bzw. werden als bekannt angenommen).
- Es ist nicht immer einfach, die Angabe bedingter Wahrscheinlichkeiten auch als solche zu erkennen!

# Bedingte Wahrscheinlichkeiten VII

- Beispiel:

In einer kleinen Druckerei stehen 3 Druckmaschinen unterschiedlicher Kapazität zur Verfügung:

- ▶ Maschine 1, mit der 50% aller Druckjobs gedruckt werden, produziert mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.1% ein fehlerhaftes Ergebnis,
- ▶ Maschine 2, mit der 30% aller Druckjobs gedruckt werden, produziert mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.25% ein fehlerhaftes Ergebnis,
- ▶ Maschine 3, mit der 20% aller Druckjobs gedruckt werden, produziert mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.5% ein fehlerhaftes Ergebnis.

Sind die interessierenden Ereignisse gegeben durch

- ▶  $M_i$ : Maschine  $i$  wird zur Produktion des Druckjobs eingesetzt ( $i \in \{1, 2, 3\}$ ),
- ▶  $F$ : Die Produktion des Druckjobs ist fehlerbehaftet,

so sind insgesamt bekannt:

$$\begin{array}{lll} P(M_1) = 0.5 & P(M_2) = 0.3 & P(M_3) = 0.2 \\ P(F|M_1) = 0.001 & P(F|M_2) = 0.0025 & P(F|M_3) = 0.005 \end{array}$$



# Bedingte Wahrscheinlichkeiten VIII

- In der Situation des Druckmaschinen-Beispiels interessiert man sich häufig für die *unbedingte* Wahrscheinlichkeit, einen fehlerhaften Druckjob zu erhalten, also für  $P(F)$ .
- Diese Wahrscheinlichkeit kann mit einer Kombination von Gleichung (1) auf Folie 174 und der letzten Rechenregel von Folie 148 berechnet werden:

## Satz 7.2 (Satz der totalen Wahrscheinlichkeit)

*Es seien  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  ein Wahrscheinlichkeitsraum und  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$  (für  $n \in \mathbb{N}$ ) eine Zerlegung von  $\Omega$ , es gelte also  $A_i \cap A_j = \emptyset$  für  $i \neq j$  und  $\bigcup_{j=1}^n A_j = \Omega$ . Für beliebige Ereignisse  $B \in \mathcal{F}$  gilt dann*

$$P(B) = \sum_{j=1}^n P(B|A_j) \cdot P(A_j) .$$

## Bedingte Wahrscheinlichkeiten IX

- Im Druckmaschinen-Beispiel erhält man so:

$$\begin{aligned}P(F) &= P(F|M_1) \cdot P(M_1) + P(F|M_2) \cdot P(M_2) + P(F|M_3) \cdot P(M_3) \\&= 0.001 \cdot 0.5 + 0.0025 \cdot 0.3 + 0.005 \cdot 0.2 \\&= 0.00225 = 0.225\%\end{aligned}$$

- Die Wahrscheinlichkeit von  $A \cap B$  kann mit Hilfe bedingter Wahrscheinlichkeiten in zwei Varianten berechnet werden:

$$P(B|A) \cdot P(A) = P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

- Dies kann (bei Kenntnis der restlichen beteiligten Wahrscheinlichkeiten!) dazu benutzt werden, Bedingung und interessierendes Ereignis umzudrehen. Ist z.B.  $P(B|A)$  (sowie  $P(A)$  und  $P(B)$ ) gegeben, so erhält man  $P(A|B)$  durch

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} .$$

# Bedingte Wahrscheinlichkeiten X

- Wird dabei die unbedingte Wahrscheinlichkeit  $P(B)$  mit dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit (Satz 7.2) berechnet, so erhält man:

## Satz 7.3 (Formel von Bayes)

Es seien  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  ein Wahrscheinlichkeitsraum und  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$  (für  $n \in \mathbb{N}$ ) eine Zerlegung von  $\Omega$ , es gelte also  $A_i \cap A_j = \emptyset$  für  $i \neq j$  und  $\bigcup_{j=1}^n A_j = \Omega$ . Sei  $B \in \mathcal{F}$  ein weiteres Ereignis mit  $P(B) > 0$ . Dann gilt:

$$P(A_k|B) = \frac{P(B|A_k) \cdot P(A_k)}{\sum_{j=1}^n P(B|A_j) \cdot P(A_j)}, \quad k \in \{1, \dots, n\}$$

- Anwendung der Formel von Bayes im Druckmaschinen-Beispiel:  
**Frage:** Wenn eine Fehlproduktion aufgetreten ist, mit welchen Wahrscheinlichkeiten sind dann die verschiedenen Druckmaschinen für den Fehldruck „verantwortlich“?

# Bedingte Wahrscheinlichkeiten XI

- Es interessiert nun also  $P(M_i|F)$  für  $i \in \{1, 2, 3\}$ .
- Mit Formel von Bayes (ohne Verwendung des Zwischenergebnisses  $P(F)$ ):

$$\begin{aligned}
 P(M_1|F) &= \frac{P(F|M_1) \cdot P(M_1)}{\sum_{i=1}^3 P(F|M_j) \cdot P(M_j)} \\
 &= \frac{0.001 \cdot 0.5}{0.001 \cdot 0.5 + 0.0025 \cdot 0.3 + 0.005 \cdot 0.2} = \frac{2}{9}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(M_2|F) &= \frac{P(F|M_2) \cdot P(M_2)}{\sum_{i=1}^3 P(F|M_j) \cdot P(M_j)} \\
 &= \frac{0.0025 \cdot 0.3}{0.001 \cdot 0.5 + 0.0025 \cdot 0.3 + 0.005 \cdot 0.2} = \frac{3}{9}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(M_3|F) &= \frac{P(F|M_3) \cdot P(M_3)}{\sum_{i=1}^3 P(F|M_j) \cdot P(M_j)} \\
 &= \frac{0.005 \cdot 0.2}{0.001 \cdot 0.5 + 0.0025 \cdot 0.3 + 0.005 \cdot 0.2} = \frac{4}{9}
 \end{aligned}$$

# Beispiel: Fehler bei bedingten Wahrscheinlichkeiten I

(aus Walter Krämer: Denkste!, Piper, München, 2000)

- Häufig (auch in den Medien!) ist der Fehler zu beobachten, dass das bedingende und das eigentlich interessierende Ereignis vertauscht werden.
- Beispiel (Schlagzeile in einer Ausgabe der ADAC-Motorwelt):

*Der Tod fährt mit!*

*Vier von zehn tödlich verunglückten Autofahrern trugen keinen Sicherheitsgurt!*

- Bezeichnet  $S$  das Ereignis „Sicherheitsgurt angelegt“ und  $T$  das Ereignis „Tödlicher Unfall“, so ist hier die Wahrscheinlichkeit  $P(\bar{S}|T) = 0.4$ , also die Wahrscheinlichkeit, keinen Sicherheitsgurt angelegt zu haben, falls man bei einem Unfall tödlich verunglückt ist, mit 40% angegeben.
- Was soll die Schlagzeile vermitteln?
  - ▶ Unwahrscheinlich: Anschnallen ist gefährlich, da 6 von 10 verunglückten Autofahrern einen Sicherheitsgurt trugen.
  - ▶ Wohl eher: Anschnallen ist nützlich!
- **Aber:** Zitierte Wahrscheinlichkeit ist absolut ungeeignet, um Nutzen des Anschnallens zu untermauern!

## Beispiel: Fehler bei bedingten Wahrscheinlichkeiten II

(aus Walter Krämer: Denkstel!, Piper, München, 2000)

- Stattdessen interessant:  $P(T|\bar{S})$  vs.  $P(T|S)$   
(Wie stehen Wahrscheinlichkeiten, bei nicht angelegtem bzw. angelegtem Sicherheitsgurt tödlich zu verunglücken, zueinander?)
- Aus  $P(\bar{S}|T)$  kann Verhältnis  $\frac{P(T|\bar{S})}{P(T|S)}$  nur berechnet werden, falls die Wahrscheinlichkeit bekannt ist, mit der ein Autofahrer angeschnallt ist:

$$P(T|S) = \frac{P(T \cap S)}{P(S)} = \frac{P(S|T) \cdot P(T)}{P(S)}$$

$$P(T|\bar{S}) = \frac{P(T \cap \bar{S})}{P(\bar{S})} = \frac{P(\bar{S}|T) \cdot P(T)}{P(\bar{S})}$$

$$\Rightarrow \frac{P(T|\bar{S})}{P(T|S)} = \frac{P(\bar{S}|T) \cdot P(S)}{P(\bar{S}) \cdot P(S|T)}$$

- Für  $P(S) = 0.9$ :  $\frac{P(T|\bar{S})}{P(T|S)} = 6$ , also Risiko ohne Gurt 6 mal höher als mit Gurt.
- Für  $P(S) = 0.2$ :  $\frac{P(T|\bar{S})}{P(T|S)} = \frac{1}{6}$ , also Risiko ohne Gurt 6 mal niedriger als mit Gurt.

# Stochastische Unabhängigkeit

- Analog zur Unabhängigkeit von Merkmalen in deskriptiver Statistik:

## Definition 7.2 (Stochastische Unabhängigkeit)

Es seien  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  ein Wahrscheinlichkeitsraum und  $A, B \in \mathcal{F}$ .  $A$  und  $B$  heißen **stochastisch unabhängig** bezüglich  $P$ , wenn gilt:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

- Ebenfalls analog zur deskriptiven Statistik sind Ereignisse genau dann unabhängig, wenn sich ihre unbedingten Wahrscheinlichkeiten nicht von den bedingten Wahrscheinlichkeiten — sofern sie definiert sind — unterscheiden:

## Satz 7.4

Es seien  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  ein Wahrscheinlichkeitsraum und  $A, B \in \mathcal{F}$ . Dann gilt

- ▶ falls  $P(A) > 0$ :  
 $A$  und  $B$  sind stochastisch unabhängig bzgl.  $P \Leftrightarrow P(B|A) = P(B)$
- ▶ falls  $P(B) > 0$ :  
 $A$  und  $B$  sind stochastisch unabhängig bzgl.  $P \Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$

- Der Begriff „Stochastische Unabhängigkeit“ ist auch für Familien mit mehr als zwei Ereignissen von Bedeutung:

### Definition 7.3

Es seien  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  ein Wahrscheinlichkeitsraum und  $(A_i)_{i \in I}$  eine Familie von Ereignissen aus  $\mathcal{F}$ . Die Familie heißt **stochastisch unabhängig**, wenn für jede endliche Teilmenge  $K \subseteq I$  gilt:

$$P\left(\bigcap_{i \in K} A_i\right) = \prod_{i \in K} P(A_i)$$

- Besteht die Familie  $(A_i)_{i \in I}$  in Definition 7.3 nur aus den drei Ereignissen  $A_1, A_2, A_3$ , so ist die Familie also stochastisch unabhängig, falls
  - 1  $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2)$
  - 2  $P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_3)$
  - 3  $P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3)$
  - 4  $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$

gilt.

Insbesondere genügt **nicht** die paarweise stochastische Unabhängigkeit der Ereignisse  $A_1, A_2, A_3$ !